



ANGIO-RESONANCIA DE CARÓTIDAS (CUELLO)

CÓDIGO:

VIGENTE DESDE: 05-07-2016

VERSIÓN: 01

El estudio no requiere ayuno.

- No existe ninguna contraindicación con ningún tipo de medicamento que tome el paciente – medicamentos pueden ser tomados como de costumbre.
- Traer estudios previos relacionados con la patología.
- No debe tener ningún objeto metálico durante el examen.
- Si el examen requiere la administración de medio de contraste, usted requiere tener un examen reciente de creatinina (1 mes de la fecha de realización del examen), si usted es: Mayor de 60 años o tiene alguno de los siguientes antecedentes:
 - ✓ Enfermedades renales de adulto, incluyendo tumor y trasplante renal.
 - ✓ Historia de Insuficiencia Renal.
 - ✓ Historia de Cirugía Renal.
 - ✓ Diabetes en tratamiento.
 - ✓ Hipertensión arterial.
 - ✓ Mieloma Múltiple.
 - ✓ Enfermedades del Colágeno (Lupus, esclerosis sistémica progresiva, artritis reumatoidea).
 - ✓ Consumo crónico regular de los siguientes medicamentos.
 - ✓ Antiinflamatorios no esteroideos (Ibuprofeno, advil, meloxicam, diclofenaco, etc).
 - ✓ Uso regular de antibióticos como Amikacina o Gentamicina.

Con este examen, en nuestro departamento de Imágenes Diagnosticas, obtendremos un valor más estimado de la función renal, y podremos evaluar la posibilidad o no de administrar el medio de contraste para su examen, sin riesgo para su salud.



**PREPARACION DEL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA
ECOCARDIOGRAMA ESTRÉS FARMACOLOGICO**

CÓDIGO: EN-PT-

VIGENTE DESDE: 05-07-2016

VERSIÓN: 01