



ANGIORESONANCIA DE ABDOMEN

CÓDIGO:

VIGENTE DESDE: 05-07-2016

VERSIÓN: 01

- Ayuno completo (nada por vía oral seis (6) horas antes del examen).
- No existe ninguna contraindicación con ningún tipo de medicamento que tome el paciente – medicamentos pueden ser tomados como de costumbre.
- Si el examen requiere la administración de medio de contraste, usted requiere tener un examen reciente de creatinina (1 mes de la fecha de realización del examen), si usted es: Mayor de 60 años.
- Tiene alguno de los siguientes antecedentes:
- Enfermedades renales de adulto, incluyendo tumor y trasplante renal Historia de Insuficiencia Renal
- Historia de Cirugía Renal.
- Diabetes en tratamiento.
- Hipertensión arterial.
- Mieloma Múltiple.
- Enfermedades del Colágeno (Lupus, esclerosis sistémica progresiva, artritis reumatoidea)
- Consumo crónico regular de los siguientes medicamentos.
- Antiinflamatorios no esteroideos (Ibuprofeno, advil, meloxicam, diclofenaco, etc).
- Uso regular de antibióticos como Amikacina o Gentamicina.

Con este examen, en nuestro departamento de Imágenes Diagnosticas, obtendremos un valor más estimado de la función renal, y podremos evaluar la posibilidad o no de administrar el medio de contraste para su examen, sin riesgo para su salud.