



RM DE ARTICULACIONES SACROILIACAS

CÓDIGO:

VIGENTE DESDE: 05-07-2016

VERSIÓN: 01

Si el estudio es SIMPLE no requiere preparación.

- Los pacientes que tienen algún elemento metálico en su cuerpo como marcapasos, gancho de aneurisma, válvulas cardíacas, implantes cocleares para sordera, bioestimuladores o alguna prótesis ortopédica, deben dirigirse o llamar antes de la cita al servicio de resonancia magnética, para que le informen si hay alguna contraindicación.
- No existe ninguna contraindicación con ningún tipo de medicamento que tome el paciente – medicamentos pueden ser tomados como de costumbre.
- Traer estudios previos relacionados con la patología.
- No debe tener ningún objeto metálico durante el examen.
- Si el examen requiere la administración de medio de contraste, usted requiere tener un examen reciente de creatinina (1 mes de la fecha de realización del examen), si usted es: Mayor de 60 años.
- Tiene alguno de los siguientes antecedentes: Enfermedades renales de adulto, incluyendo tumor y trasplante renal. Historia de Insuficiencia Renal. Historia de Cirugía Renal.
- El estudio no requiere ayuno.
- No existe ninguna contraindicación con ningún tipo de medicamento que tome el paciente – medicamentos pueden ser tomados como de costumbre.
- Traer estudios previos relacionados con la patología.
- No debe tener ningún objeto metálico durante el examen
- Diabetes en tratamiento.
- Hipertensión arterial.
- Mieloma Múltiple.
- Enfermedades del Colágeno (Lupus, esclerosis sistémica progresiva, artritis reumatoidea).
- Consumo crónico regular de los siguientes medicamentos.



**PREPARACION DEL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA
ECOCARDIOGRAMA ESTRÉS FARMACOLOGICO**

CÓDIGO: EN-PT-

VIGENTE DESDE: 05-07-2016

VERSIÓN: 01

- Antiinflamatorios no esteroideos (Ibuprofeno, advil, meloxicam, diclofenaco, etc).
- Uso regular de antibióticos como Amikacina o Gentamicina. Con este examen, en nuestro departamento de Imágenes Diagnosticas, obtendremos un valor más estimado de la función renal, y podremos evaluar la posibilidad o no de administrar el medio de contraste para su examen, sin riesgo para su salud.