



RM DE PELVIS

CÓDIGO:

VIGENTE DESDE: 05-07-2016

VERSIÓN: 01

El estudio no requiere ayuno.

No existe ninguna contraindicación con ningún tipo de medicamento que tome el paciente – medicamentos pueden ser tomados como de costumbre.

Tomar 2 tabletas de buscapina, 2 horas antes del examen.

Desocupar la vejiga antes de iniciar el examen de Resonancia.

Traer estudios previos relacionados con la patología.

No debe tener ningún objeto metálico durante el examen.

Si el examen requiere la administración de medio de contraste, usted requiere tener un examen reciente de creatinina (1 mes de la fecha de realización del examen), si usted es: Mayor de 60 años.

- Tiene alguno de los siguientes antecedentes:
- Enfermedades renales de adulto, incluyendo tumor y trasplante renal Historia de Insuficiencia Renal
- Historia de Cirugía Renal.
- Diabetes en tratamiento.
- Hipertensión arterial.
- Mieloma Múltiple.
- Enfermedades del Colágeno (Lupus, esclerosis sistémica progresiva, artritis reumatoidea)
- Consumo crónico regular de los siguientes medicamentos.
- Antiinflamatorios no esteroideos (Ibuprofeno, advil, meloxicam, diclofenaco, etc).
- Uso regular de antibióticos como Amikacina o Gentamicina Con este examen, en nuestro departamento de Imágenes Diagnosticas, obtendremos un valor más estimado de la función renal, y podremos evaluar la posibilidad o no de administrar el medio de contraste para su examen, sin riesgo para su salud.