



## RM DE PELVIS

**CÓDIGO:**

**VIGENTE DESDE: 05-07-2016**

**VERSIÓN: 01**

- El estudio no requiere ayuno
- No existe ninguna contraindicación con ningún tipo de medicamento que tome el paciente – medicamentos pueden ser tomados como de costumbre.
- Traer estudios previos relacionados con la patología.
- Desocupar la vejiga antes de iniciar el examen de Resonancia.
- No debe tener ningún objeto metálico durante el examen.
- Si el examen requiere la administración de medio de contraste, usted requiere tener un examen reciente de creatinina (1 mes de la fecha de realización del examen), si usted es: Mayor de 60 años.

Tiene alguno de los siguientes antecedentes:

- Enfermedades renales de adulto, incluyendo tumor y trasplante renal  Historia de Insuficiencia Renal
- Historia de Cirugía Renal.
- Diabetes en tratamiento.
- Hipertensión arterial.
- Mieloma Múltiple.
- Enfermedades del Colágeno (Lupus, esclerosis sistémica progresiva, artritis reumatoidea)
- Consumo crónico regular de los siguientes medicamentos.
- Antiinflamatorios no esteroideos (Ibuprofeno, advil, meloxicam, diclofenaco, etc).
- Uso regular de antibióticos como Amikacina o Gentamicina.

Con este examen, en nuestro departamento de Imágenes Diagnosticas, obtendremos un valor más estimado de la función renal, y podremos evaluar la posibilidad o no de administrar el medio de contraste para su examen, sin riesgo para su salud.



**PREPARACION DEL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA  
ECOCARDIOGRAMA ESTRÉS FARMACOLOGICO**

**CÓDIGO: EN-PT-**

**VIGENTE DESDE: 05-07-2016**

**VERSIÓN: 01**